

## وضعیت گله های مرغداری صنعتی شهرکرد و مرغداری مائده (اتکا) با استفاده از پریبیوتیک فرمکتو به صورت اختصار

### شرکت مرغداری صنعتی شهرکرد

تاریخ جوجه ریزی آبان ماه 85

مجموع جوجه ریزی 82450 قطعه در شش سالن

مجموع تلفات هفته اول 1/3 %

میانگین وزن در 35 روزگی 950 گرم

میانگین وزن در 52 روزگی 2/245 کیلو گرم

ضریب تبدیل هر یک از سالنها به ترتیب 1/89 ، 1/96 ، 1/9 ، 2 ، 2/1 و 2 و نهایتاً به طور میانگین 1/98 بوده است .

میانگین عملکرد این پری بیوتیک در جایگزینی آن با آنتی بیوتیک از نظر سلامت گله و کنترل بیماری در پایان دوره درگیری ، مؤثر تشخیص داده شده است . چنانچه در زمان درگیری گله با بیماری آنفولانزا ، زمان پاسخگویی به داروها درسالنهای مورد آزمایش ، 7 روزسریعتر از سالنهایی بوده که در جیره ی آنها پری بیوتیک فرمکتو تعبیه نشده بود .

شایان ذکر است که گله در سن 31 روزگی درگیر بیماری آنفولانزا از نوع H9 گردید و 10 % تلفات پی آمد داشت . پس از گذراندن دوره بیماری ، تلفات هر سالن یک رقمی شد . در طی بیماری حدود 48 ساعت به صورت متناوب گله دسترسی به دان نداشت .

### شرکت مرغداری مائده (اتکا)

تاریخ جوجه ریزی اسفند ماه 85

مجموع جوجه ریزی 79410 قطعه در 10 سالن

مجموع تلفات هفته اول 0/73 %

میانگین وزن در 42 روزگی 1950 گرم

میانگین ضریب تبدیل در پایان دوره 1/9 بوده است .

لازم به ذکر است از تاریخهای قید شده تا کنون ، دو فارم مذکور به صورت مداوم درجیره های خود از پری بیوتیک فرمکتو استفاده می کنند .